

41a

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Caractère multiplicatif d'un module de Fredholm.
Note de **Alain Connes**, Membre de l'Académie et **Max Karoubi**.

Remise le 1^{er} octobre 1984.

Nous définissons un accouplement $\text{Ell}^p(\mathcal{A}) \times K_{p+1}(\mathcal{A}) \rightarrow C^*$, où \mathcal{A} est une C-algèbre quelconque, $\text{Ell}^p(\mathcal{A})$ est le groupe engendré par les modules de Fredholm $(p+1)$ -sommables [7] et où $K_{p+1}(\mathcal{A})$ est le groupe de K-théorie algébrique de Quillen [10]. Cet accouplement généralise la construction de l'extension centrale des « groupes de lacets » $C^\infty(S^1, U(n))$ par C^* [18].

MATHEMATICAL ANALYSIS. — Multiplicative Character of a Fredholm Module.

We define a pairing $\text{Ell}^p(\mathcal{A}) \times K_{p+1}(\mathcal{A}) \rightarrow C^*$ where \mathcal{A} is an arbitrary C-algebra, $\text{Ell}^p(\mathcal{A})$ is the group generated by $(p+1)$ -summable Fredholm modules [7] and where $K_{p+1}(\mathcal{A})$ is the algebraic K-theory group of Quillen [10]. This pairing extends the construction of the central extension of the loop groups $C^\infty(S^1, U(n))$ by C^* [18].

I. LES GROUPES $\text{Ell}^p(\mathcal{A})$. — Soit \mathcal{A} une C-algèbre. Une structure de \mathcal{A} -module à gauche sur un espace hilbertien H est la donnée d'un homomorphisme π de \mathcal{A} dans l'algèbre $\mathcal{L}(H)$ des opérateurs bornés dans H . Nous noterons $\mathcal{K}(H)$ l'idéal bilatère de $\mathcal{L}(H)$ formé des opérateurs compacts. La notion de *module de Fredholm* rappelée ci-dessous est due à Atiyah [4] dans le cas pair et à Brown, Douglas, Fillmore et Kasparov ([5], [15]) dans le cas impair.

DÉFINITION 1. — (a) Un module de Fredholm impair sur \mathcal{A} est donné par un couple (H, F) où H est un espace hilbertien qui est un \mathcal{A} -module à gauche et où $F \in \mathcal{L}(H)$ avec $F^2 = 1$ et $[F, \pi(a)] \in \mathcal{K}(H)$ pour tout $a \in \mathcal{A}$. (b) Un module de Fredholm pair sur \mathcal{A} est donné par un couple (H, F) comme dans (a) et d'une $\mathbb{Z}/2$ -graduation [1] de H telle que $\varepsilon F = -F \varepsilon$ et $\varepsilon \pi(a) = \pi(a) \varepsilon$ pour tout $a \in \mathcal{A}$.

Pour tout $p \in [1, +\infty[$, on désigne par $\mathcal{L}^p(H)$ l'idéal de Schatten de $\mathcal{L}(H)$, c'est-à-dire l'ensemble des opérateurs T tels que $\text{Trace}(|T|^p) < +\infty$.

DÉFINITION 2. — Un module de Fredholm (H, F) est dit *p-sommable* si, pour tout $a \in \mathcal{A}$, $[F, \pi(a)] \in \mathcal{L}^p(H)$.

Pour tout nombre entier p positif ou nul, on désigne par $\mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})$ l'ensemble des classes d'isomorphie de modules de Fredholm (H, F) sur \mathcal{A} tels que : (i) H est un espace hilbertien à base dénombrable; (ii) (H, F) a la même parité que p ; (iii) (H, F) est $(p+1)$ -sommable.

Muni de l'opération de somme directe, $\mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})$ est un semi-groupe commutatif. Soit $(H, F)^-$ l'élément de $\mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})$ obtenu en changeant F en $(-1)^p F$ et ε en $-\varepsilon$ (si p est pair).

PROPOSITION 3. — (a) Le quotient de $\mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})$ par le semi-groupe $\{x + x^-, x \in \mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})\}$ est un groupe commutatif noté $\text{Ell}^p(\mathcal{A})$. (b) L'inclusion de $\mathcal{E}ll^p(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{E}ll^{p+2}(\mathcal{A})$ induit un homomorphisme $S: \text{Ell}^p(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Ell}^{p+2}(\mathcal{A})$.

Soit H_0 l'espace hilbertien $l^2(\mathbb{N})$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, nous allons définir l'algèbre \mathcal{M}^p suivante : si p est pair, $\mathcal{M}^p = \{(x, y) \in \mathcal{L}(H_0) \times \mathcal{L}(H_0) \text{ avec } x - y \in \mathcal{L}^{p+1}(H_0)\}$; si p est impair, \mathcal{M}^p est la sous-algèbre des matrices 2×2 sur l'anneau $\mathcal{L}(H_0)$ formée des matrices $a = (a_{ij})$ telles que $a_{ij} \in \mathcal{L}^{p+1}(H_0)$ si $i \neq j$.

Soit $(H, F)_p$ l'élément de $\text{Ell}^p(\mathcal{M}^p)$ obtenu en posant $H = H_0 \oplus H_0$ avec l'action évidente de \mathcal{M}^p et les opérateurs F et ε suivants : si p est pair $F_{11} = F_{22} = 0, F_{12} = F_{21} = 1, \varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = 0, \varepsilon_{11} = -\varepsilon_{22} = 1$; si p est impair $F_{12} = F_{21} = 0, F_{11} = -F_{22} = 1$. On a alors la

proposition évidente suivante :

PROPOSITION 4. — (a) Ell^p est un foncteur contravariant de la catégorie des \mathbb{C} -algèbres dans celle des groupes commutatifs. (b) Pour tout $x \in \text{Ell}^p(\mathcal{A})$, il existe un homomorphisme d'algèbres $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{M}^p$ tel que $x = \rho^*((H, F)_p)$.

II. K-THÉORIE TOPOLOGIQUE ET COHOMOLOGIE CYCLIQUE DES ALGÈBRES DE BANACH \mathcal{M}^p . — Pour tout $q \in [1, +\infty[$, on note $\| \cdot \|_q$ la norme canonique sur $\mathcal{L}^q(H)$. On peut alors munir les algèbres \mathcal{M}^p des normes suivantes qui en font des algèbres de Banach :

$$\|x\| = \|x\|_\infty + \|[F, x]\|_{p+1},$$

où $\|x\|_\infty$ désigne la norme usuelle des opérateurs dans $H = H_0 \oplus H_0$. De plus, d'après [7], \mathcal{M}^p est une sous-algèbre stable par calcul fonctionnel holomorphe dans la \mathbb{C}^* -algèbre \mathcal{M}_j , $j=0$ ou 1 avec $j \equiv p \pmod{2}$, qui est l'adhérence de \mathcal{M}^p dans $\mathcal{L}(H)$. Du théorème de périodicité de Bott [11], p. 175 et du théorème de densité ([11], p. 109), on déduit alors la proposition suivante.

PROPOSITION 5. — Les groupes $K_n^{\text{top}}(\mathcal{M}^p)$ sont isomorphes à \mathbb{Z} si $n \equiv p \pmod{2}$ et sont égaux à 0 si $n \equiv p+1 \pmod{2}$.

L'homologie et la cohomologie cycliques des algèbres de Banach \mathcal{M}^p sont moins connues [7]. Cependant, on peut définir des éléments remarquables non triviaux τ_p de $\text{HC}^p(\mathcal{M}^p)$ par les formules suivantes [7]. Si p est pair :

$$\tau_p((x^0, y^0), (x^1, y^1), \dots, (x^p, y^p)) = c_p \text{Trace}((x^0 - y^0) \cdot (x^1 - y^1) \dots (x^p - y^p)),$$

avec $c_p = (p/2)!$. Si p est impair :

$$\tau_p(a^0, a^1, \dots, a^p) = c_p \text{Trace} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a_{12}^0 \\ a_{21}^0 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 0 & a_{12}^p \\ a_{21}^p & 0 \end{pmatrix},$$

avec :

$$c_p = \frac{p}{2} \left(\frac{p}{2} - 1 \right) \dots \frac{1}{2}.$$

On remarquera que le « caractère de Chern topologique » défini dans [8] et [14] :

$$\mathbb{Z} \approx K_p^{\text{top}}(\mathcal{M}^p) \rightarrow \text{HC}_p(\mathcal{M}^p) \xrightarrow{\tau_p} \mathbb{C},$$

a comme image le sous-groupe $r_p \mathbb{Z}$ où $r_p = (2i\pi)^{[p/2]}$ avec les constantes de normalisation c_p choisies [3].

III. DÉFINITION DES GROUPES DE K-THÉORIE RELATIVE $K_n^{\text{rel}}(A)$ ET DES HOMOMORPHISMES $K_n^{\text{rel}}(A) \rightarrow \text{HC}_{n-1}(A)$ (voir aussi IV). — Si A est une algèbre topologique localement convexe, nous suivrons [14] en définissant $K_n^{\text{top}}(A)$ pour $n > 0$ comme le n -ième groupe d'homotopie de l'ensemble simplicial $\text{BGL}(A_*)$ où A_* est l'anneau simplicial défini par $A_n = A \hat{\otimes} C^\infty(\Delta^n)$, Δ^n étant le n -simplexe standard. En particulier, $K_n^{\text{top}}(A)$ est le groupe de K-théorie topologique usuel si A est une algèbre de Banach, ce que nous supposons désormais. Nous définirons le groupe de « K-théorie relative » $K_n^{\text{rel}}(A)$ comme le n -ième groupe d'homotopie de la fibre homotopique \mathcal{F}_A de l'application évidente :

$$\text{BGL}(A)^+ = \text{BGL}(A_0)^+ \rightarrow \text{BGL}(A_*)^+ \sim \text{BGL}(A_*).$$

On a donc une suite exacte fondamentale :

$$K_{n+1}(A) \rightarrow K_{n+1}^{\text{top}}(A) \rightarrow K_n^{\text{rel}}(A) \rightarrow K_n(A) \rightarrow K_n^{\text{top}}(A),$$

où $K_*(A)$ représente la K-théorie algébrique de Quillen. En fait, il est facile de voir que l'espace \mathcal{F}_A est homotopiquement équivalent à $Bgl(A)^+$ où $Bgl(A)$ est la fibre homotopique de l'application $BGL(A_0) \rightarrow BGL(A_*)$, fibre qui s'identifie au quotient $GL(A_*)/GL(A_0)$ du groupe simplicial $GL(A_*)$ par le groupe simplicial trivial $GL(A)$ (cf. [17] pour une discussion analogue et une justification de la notation $Bgl(A)$). Ainsi un n -simplexe de $Bgl(A)$ est simplement défini par une application $C^\infty \sigma: \Delta^n \rightarrow GL(A)$ bien définie modulo la multiplication à droite par un élément de $GL(A)$. Sur cet ensemble simplicial il existe un $GL(A_0)$ -fibré canonique induit par l'application $GL(A_*)/GL(A_0) \rightarrow BGL(A_0)$: ses fonctions de transition $g_{ji}(\sigma)$ dans le sens de [14] sont définies par $g_{ji}(\sigma) = \sigma(j) \sigma(i)^{-1}$. Considéré comme $GL(A_*)$ -fibré par extension du groupe structural, ce fibré se trivialise de manière explicite en posant $\alpha_i(\sigma) = \sigma \cdot \sigma(i)^{-1}$, soit $g_{ji} = \alpha_j^{-1} \cdot \alpha_i$. Si $\alpha: E \rightarrow T$ désigne la trivialisation, la méthode décrite dans [12] et [14] permet d'associer au triplet $x = (E, T, \alpha)$ un « caractère de Chern relatif » $Ch_n^{rel}(x) \in H^n(Bgl(A); C_{n-1}^\lambda(A)/b(C_n^\lambda(A)))$ avec les notations de [8] et [16]. En utilisant l'homomorphisme de Hurewicz, on en déduit un homomorphisme :

$$Ch_n^{rel}: K_n^{rel}(A) \rightarrow C_{n-1}^\lambda(A)/b(C_n^\lambda(A)),$$

dont on peut montrer qu'il coïncide avec celui défini dans [14], l'espace $Bgl(A)$ jouant le rôle « d'espace classifiant » pour la K-théorie relative. Des définitions et résultats de [8] et [14] il est facile de déduire les deux théorèmes suivants (où $\gamma_n = 1/n!$).

THÉORÈME 6. — *L'image de l'homomorphisme Ch_n^{rel} est contenue dans le sous-groupe $H_{n-1}^\lambda(A) = HC_{n-1}(A) \subset C_{n-1}^\lambda(A)/b(C_n^\lambda(A))$.*

THÉORÈME 7. — *Le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccccccccc} K_{n+1}^{top}(A) & \rightarrow & K_n^{rel}(A) & \rightarrow & K_n(A) & \rightarrow & K_n^{top}(A) & \rightarrow & K_{n-1}^{rel}(A) \\ Ch_{n+1} \downarrow & & Ch_n^{rel} \downarrow & & \gamma_n D_n \downarrow & & Ch_n \downarrow & & Ch_{n-1}^{rel} \downarrow \\ HC_{n+1}(A) & \xrightarrow{S} & HC_{n-1}(A) & \xrightarrow{(1/n)B} & H_n(A, A) & \xrightarrow{I} & HC_n(A) & \xrightarrow{S} & HC_{n-2}(A). \end{array}$$

Examinons de plus près la définition du caractère de Chern relatif sur l'espace $Bgl(A)$ de manière à assurer la transition vers le paragraphe suivant et donner une formule plus maniable. On considère sur le fibré E la « connexion canonique » définie en fonction des coordonnées barycentriques x_k par la formule utilisée dans [12] et où i représente un sommet du simplexe σ :

$$\Gamma_i(\sigma) = \sum_k x_k g_{ki}^{-1} dg_{ki}.$$

Cette connexion, transportée sur le fibré trivial T par l'isomorphisme α , est égale à :

$$\alpha_i \Gamma_i \alpha_i^{-1} + \alpha_i d(\alpha_i^{-1}) = -\sum_k x_k d\alpha_k \cdot \alpha_k^{-1}$$

(expression notée Γ qui, comme on s'y attend, ne dépend pas de i). Ici $d = d' + d''$ où d' est la différentielle usuelle des formes différentielles sur l'ensemble simplicial $Bgl(A)$ [6] et où d'' est la différentielle « non commutative » sur le complexe $\Omega_*(A^+)$, A^+ désignant l'algèbre A augmentée d'un élément unité ([8], [13]). En considérant l'homotopie $t\Gamma$ entre Γ et la connexion triviale, la formule explicite pour $Ch_n^{rel}(x)$ est la classe du cocycle :

$$\sigma \mapsto \frac{1}{(n-1)!} \text{Trace} \int_\sigma \int_0^1 dt \wedge \Gamma(t d\Gamma + t^2 \Gamma^2)^{n-1}.$$

On a $\Gamma = -\Gamma' + \Gamma''$ avec $\Gamma' = d' \alpha_k \cdot \alpha_k^{-1}$ (qui est indépendant de k et qu'on peut noter aussi $d' \sigma \cdot \sigma^{-1}$) et $\Gamma'' = -\sum x_k d'' \alpha_k \cdot \alpha_k^{-1}$. On ne change pas alors la classe de cohomologie précédente en remplaçant Γ par $-\Gamma'$ dans l'intégrale ci-dessus (faire l'homotopie $-\Gamma' + u\Gamma''$, $u \in [0, 1]$). On en déduit que $\text{Ch}_n(x)$ est aussi la classe du cocycle suivant d'expression plus simple :

$$\sigma \mapsto \frac{(-1)^n}{n!} \text{Trace} \int_{\sigma} \Gamma' (d'' \Gamma')^{n-1}.$$

IV. INTERPRÉTATION DES CLASSES CARACTÉRISTIQUES RELATIVES EN TERMES DE COHOMOLOGIE D'ALGÈBRES DE LIE. — Le but de ce paragraphe est de donner une définition plus géométrique de l'accouplement $K_n^{\text{rel}}(A) \times H_n^{n-1}(A) \rightarrow \mathbb{C}$ qu'on déduit de III (cf. le théorème 9 ci-dessous qu'on appliquera à une sphère homologique M en interprétant la K -théorie relative en termes de A -fibrés plats sur M munis d'une trivialisation différentiable [12]). Soit donc $\tau \in Z_n^{n-1}(A)$ un $(n-1)$ -cocycle cyclique continu [2]. En suivant [16], § 6, on en déduit une forme différentielle fermée ω_{τ} , invariante à droite sur le groupe de Lie-Banach $GL_q(A)$, $q \in \mathbb{N}$, en posant :

$$\omega_{\tau}((a, X^1), \dots, (a, X^n)) = \frac{(-1)^n}{n!} \sum \text{sgn}(s) (\tau \otimes \text{Tr}) (X^{s_1} a^{-1}, X^{s_2} a^{-1}, \dots, X^{s_n} a^{-1}).$$

Ici s parcourt le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$, (a, X) désigne pour $a \in GL_q(A)$, $X \in M_q(A)$, le vecteur tangent en $\varepsilon=0$ à la courbe $\varepsilon \mapsto a + \varepsilon X$, et $\tau \otimes \text{Tr}$ désigne l'élément de $Z_n^{n-1}(M_q(A))$ produit tensoriel de τ par la trace canonique Tr sur $M_q(\mathbb{C})$.

REMARQUE. — Un calcul simple montre que ω_{τ} est aussi :

$$\frac{(-1)^n}{n!} (\tau \otimes \text{Tr}) (\theta (d'' \theta)^{n-1}),$$

où $\theta = d' a \cdot a^{-1}$ est la « forme de Maurer-Cartan » sur $GL_q(A)$ avec des notations évidentes. Cette remarque est essentielle pour montrer que les deux interprétations des classes caractéristiques relatives coïncident.

Si M est une variété de classe C^{∞} , tout courant fermé C à support compact et de dimension n définit un n -cocycle cyclique \tilde{C} sur l'algèbre $C^{\infty}(M)$ par l'égalité :

$$\tilde{C}(f^0, f^1, \dots, f^n) = \langle C, f^0 df^1 \wedge \dots \wedge df^n \rangle \quad \text{pour } f^i \in C^{\infty}(M).$$

THÉORÈME 8. — Soit $\alpha: M \rightarrow GL_q(A)$ une application de classe C^{∞} et soit $\tilde{C} \# \tau$ le produit tensoriel de \tilde{C} par τ [8] comme cocycle cyclique sur $C^{\infty}(M) \hat{\otimes} A$. Alors :

(a) On a l'identité $\langle [C], \alpha^* \omega_{\tau} \rangle = \langle \tilde{C} \# \tau, [\alpha] \rangle$ où $[\alpha] \in K_1^{\text{top}}(C^{\infty}(M) \hat{\otimes} A)$ est la classe de $\alpha \in GL_q(C^{\infty}(M) \hat{\otimes} A)$ et où l'accouplement entre HC^* et K_*^{top} est défini dans [8].

(b) Si la classe d'homologie $[C]$ de $H_n(M)$ appartient à l'image de l'homomorphisme de Hurewicz $\pi_n(M^+) \rightarrow H_n(M^+) \approx H_n(M)$ [10], on a $\langle [C], \alpha^* \omega_{\tau} \rangle \in 2i\pi \langle \tau, K_{n-1}^{\text{top}}(A) \rangle$.

La partie (a) se démontre en utilisant l'homotopie $-\Gamma' + u\Gamma''$ du paragraphe III. La partie (b) résulte de (a), de la périodicité de Bott et de la multiplicativité du caractère de Chern topologique.

Soit maintenant E un fibré plat de A -modules à droite, de fibre A^q , sur la variété M . Il lui correspond un homomorphisme ρ de $\Gamma = \pi_1(M)$ dans $GL_q(A)$. Le A -module $C^{\infty}(M, E)$ des sections de E s'identifie au A -module des applications $\xi: \tilde{M} \rightarrow A^q$, où \tilde{M} est le revêtement universel sur lequel on fait agir Γ librement à droite, telles que $\xi(xg) = \rho(g)^{-1} \xi(x)$, $x \in \tilde{M}$, $g \in \Gamma$. De même, une trivialisation $\alpha: E \rightarrow M \times A^q$ correspond

à une application $\tilde{\alpha}: \tilde{M} \rightarrow GL_q(A)$ telle que $\tilde{\alpha}(xg) = \tilde{\alpha}(x)\rho(g)$. Le théorème suivant est alors une conséquence directe du théorème 8.

THÉORÈME 9. — Soit $\alpha^* \omega_\tau$ la forme différentielle sur M associée à la forme différentielle Γ -invariante $\tilde{\alpha}^* \omega_\tau$ sur \tilde{M} et soit $c \in H_n(M)$ une classe d'homologie appartenant à l'image de l'homomorphisme de Hurewicz. Alors, l'image de $\langle c, \alpha^* \omega_\tau \rangle$ dans le quotient de \mathbb{C} par le sous-groupe $2i\pi \langle \tau, K_{n-1}^{\text{top}}(A) \rangle$ est indépendante du choix de la trivialisaton α .

V. DÉFINITION DE L'ACCOUPLLEMENT $\text{Ell}^p(\mathcal{A}) \times K_{p+1}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}^*$. — Nous allons tout d'abord définir un homomorphisme $K_{p+1}(\mathcal{M}^p) \rightarrow \mathbb{C}^*$. Cette définition est basée sur le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} K_{p+2}^{\text{top}}(\mathcal{M}^p) & \rightarrow & K_{p+1}^{\text{rel}}(\mathcal{M}^p) & \longrightarrow & K_{p+1}(\mathcal{M}^p) \rightarrow K_{p+1}^{\text{top}}(\mathcal{M}^p) = 0 \\ \downarrow u = \text{Ch}_{p+2} & & \downarrow \text{Ch}_1^{\text{rel}} & & \downarrow \\ \text{HC}_{p+2}(\mathcal{M}^p) & \xrightarrow{S} & \text{HC}_p(\mathcal{M}^p) & \xrightarrow{\tau_p} & \mathbb{C}. \end{array}$$

En effet, d'après le paragraphe II, $K_{p+2}^{\text{top}}(\mathcal{M}^p) \approx \mathbb{Z}$ et $(\tau_p \cdot S \cdot u)(\mathbb{Z}) = r_{p+2} \mathbb{Z}$ avec $r_{p+2} = (2i\pi)^{[p/2]+1}$. D'après le paragraphe III, on en déduit aussitôt l'homomorphisme $K_{p+1}(\mathcal{M}^p) \rightarrow \mathbb{C}/r_{p+2} \mathbb{Z} \approx \mathbb{C}^*$. Nous pouvons aussi raisonner plus géométriquement comme dans le paragraphe IV : un élément de $K_{p+1}(\mathcal{M}^p)$ peut être représenté par un A -fibré plat sur une n -sphère homologique M ($n=p+1, A=\mathcal{M}^p$) de classe fondamentale $c \in H_n(M)$ [10]. Puisque $K_n^{\text{top}}(A) = 0$, ce fibré plat est stablement et différentiablement trivial. Le choix d'une trivialisaton α de E (supposé stabilisé) permet de définir un nombre complexe $\langle c, \alpha^* \omega_\tau \rangle$ bien défini modulo $r_{p+2} \mathbb{Z}$ d'après le théorème 9 (cf. la remarque à la fin du paragraphe II).

D'autre part, il résulte de la définition de τ_p que l'involution de \mathcal{M}^p définie par $(x, y) \mapsto (y, x)$ si p est pair et $u \mapsto F \cdot u \cdot F^{-1}$ si p est impair, change le signe de τ_p . Puisque tout élément de $\text{Ell}^p(\mathcal{A})$ est une combinaison linéaire de représentations $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{M}^p$, il en résulte que l'accouplement cherché est bien défini d'après la proposition 4.

VI. LES CAS $p=0$ ET $p=1$. — Soit A une algèbre de Banach quelconque. On a $K_1^{\text{rel}}(A) \approx H_1(GL(A_*)/GL(A))$ avec les notations du paragraphe III. Pour toute cellule

σ de dimension 1 de $GL(A_*)/GL(A)$, on a $\text{Ch}_1^{\text{rel}}(\sigma) = \text{Tr} \int_0^1 d' \sigma \cdot \sigma^{-1}$, où $\sigma(t), t \in [0, 1]$, est un chemin dans $GL(A)$. Pour $n=1$ on démontre ainsi de manière élémentaire le diagramme commutatif du théorème 7 :

$$\begin{array}{ccccccc} K_2(A) & \rightarrow & K_2^{\text{top}}(A) & \rightarrow & K_1^{\text{rel}}(A) & \xrightarrow{u} & K_1(A) \xrightarrow{v} K_1^{\text{top}}(A) \\ & & \downarrow \text{Ch}_2 & \searrow w & \downarrow \text{Ch}_1^{\text{rel}} & & \downarrow & / \\ & & \text{HC}_2(A) & \xrightarrow{S} & \text{HC}_0(A) & \xrightarrow{B} & H_1(A, A) \rightarrow \end{array}$$

L'application u est induite par $\sigma \mapsto \sigma(0)^{-1} \sigma(1)$ et l'application $w: K_0(A) \approx K_2^{\text{top}}(A) \rightarrow \text{HC}_0(A)$ est induite par $e \mapsto 2i\pi \text{Trace}(e)$ où e est un idempotent représentant un élément de $K_0(A)$. La classe caractéristique « secondaire » obtenue $\text{Ker}(v) \rightarrow \text{HC}_0(A)/\text{Im}(w)$ coïncide avec celle construite indépendamment dans [9] et évoquée dans [14]. Étudions maintenant le cas particulier où $A = \mathcal{M}_0$.

THÉORÈME 10. — L'homomorphisme $K_1(\mathcal{M}^0) \rightarrow \mathbb{C}^*$ défini dans le paragraphe précédent coïncide avec le déterminant de Fredholm $(x, y) \mapsto \det(x^{-1}y)$.

